

Quelques conseils pour l'emploi des produits StepSept

Pour déterminer à quelle fréquence, à quelle concentration et quel protocole de traitement est requis pour garder le piétin sous contrôle, il y a plusieurs facteurs-clé à considérer. Ce guide ne dresse pas une liste exhaustive de tous les facteurs ou problèmes potentiels mais se veut un point de départ pour vous aider à établir votre propre protocole. Veuillez consulter votre vétérinaire et votre tailleur de sabots professionnel pour compléter l'établissement d'un protocole adapté à votre ferme laitière.

Évaluez l'état de santé actuel des sabots. Durant la traite, évaluez au moins 50% (ou un échantillon représentatif) de votre troupeau à l'aide des formulaires fournis.

POINTAGE MOYEN DE L'HYGIÈNE DES SABOTS



Hygiène 1



Hygiène 2



Hygiène 3



Hygiène 4

Pointage 1: Sur cette ferme, on effectue un très bon travail de nettoyage des allées, des corridors et garde les stalles propres. Les problèmes d'infection du sabot sont réduits au minimum ici. Le protocole de gestion des bains de sabots est efficace et il n'y a pas de changement requis.

Pointage 2: Sur cette ferme, le travail est adéquat mais pourrait être amélioré. Un nettoyage plus fréquent des allées serait l'idéal, mais l'emploi d'un pré-bain ou un bain nettoyant à l'aide du **StepSept PB-50** aiderait beaucoup aussi.

Pointage 3: Une amélioration est nécessaire. Les vaches marchent dans de trop grandes quantités de fumier et la dermatite (piétin-fraise) devient un problème. Il faut nettoyer les allées plus souvent (3 fois par jour). Faire un pré-bain à l'aide du **StepSept PB-50** tout continuant à utiliser le pré-bain les jours où un traitement n'est pas programmé.

Pointage 4: Sur cette ferme, les problèmes infectieux des sabots sont très grands. Il faut nettoyer les allées plus fréquemment (au moins 3 fois par jour). Il faut nettoyer les sabots avec le **StepSept PB-50** dans le pré-bain, deux fois par jour.

Voyez-vous la dermatite (piétin-fraise)?



Dermatite légère = 1



Dermatite modérée = 2



Dermatite sévère = 3

Pointage 0: La ferme effectue un excellent travail de contrôle. Le protocole de gestion des bains de sabots est efficace et il n'y a pas de changement requis.

Pointage 1: Le travail effectué est adéquat mais pourrait être amélioré. Le bain de sabots devrait être employé un jour de plus hebdomadairement. L'emploi d'un pré-bain ou d'un bain nettoyant à l'aide du **StepSept PB-50** est aussi recommandé.

Pointage 2: Une amélioration est requise. Augmenter la puissance de la solution traitante du bain de sabots et l'employer un jour de plus hebdomadairement. Utiliser un pré-bain contenant le **StepSept PB-50**, avant le traitement, tout comme les jours où il n'y a pas de traitement programmé. Pour des résultats plus rapides, appliquer **StepSept FB-T100** directement sur les sabots.

Pointage 3: Sur cette ferme, les problèmes infectieux des sabots sont très grands. Pour prendre le contrôle des problèmes de dermatite, utiliser le **StepSept FB-T100** en application topique, à l'aide d'un vaporisateur. Pour une période de dix jours consécutifs minimum, vaporiser le **StepSept FB-T100** directement sur les sabots, une fois par jour, au moment de la traite. Au moment des autres traites quotidiennes, utilisez le pré-bain et un bain avec solution traitante.

Lorsque les dermatites seront sous contrôle, le protocole de maintenance pourra être appliqué. Il faut continuer l'emploi du bain de sabots. L'application d'une solution topique non-diluée **StepSept FB-T100** peut être requise à raison d'une ou deux fois par semaine.